



腮腺炎

资料单



腮腺炎是由腮腺炎病毒导致的疾病。



当感染了腮腺炎的人咳嗽或打喷嚏时、或者当一个人触碰了被病毒污染的表面后揉搓眼睛、触摸鼻子或嘴巴时，腮腺炎就会传播。

体征和症状




淋巴腺肿大



发烧



头疼



肌肉痛

最常见的体征和症状是发烧、头痛、肌肉痛、疲劳、丧失胃口，并伴随一侧或双侧耳下腮腺肿大并有压痛。约有一半腮腺炎患者体征/症状轻微或无体征/症状。并发症包括睾丸红肿（男性）、卵巢肿大（女性）、脑部或脊髓膜水肿、流产以及永久性地丧失听力。

腮腺炎相关体征和症状通常在感染后16-18天开始出现，但是也可能短至12天、长至25天后出现。腮腺炎可以在腮腺肿大开始前几天及开始后5天内传播。患者在腮腺开始肿大后应隔离5天。

预防



- 接种腮腺炎疫苗（通常被称作MMR）是预防腮腺炎的最好途径。



- 用肥皂洗手
- 不要共用餐具
- 经常清洁共用表面

尚无针对腮腺炎的特定治疗方法。

要了解更多信息：



如果您认为您患上了腮腺炎或是想了解更多信息，请联系您的医生或拨打1-800-821-5821联系缅因州疾病控制与预防中心。

您也可以访问 www.cdc.gov/mumps。