





Tosferina (tos convulsiva)

Hoja informativa



La tosferina o tos convulsiva la causa una bacteria. Personas de cualquier edad pueden contraer la tosferina.



Se transmite de persona a persona a través del aire, generalmente al toser o estornudar. Una persona tiene que inhalar las gotitas de una persona infectada para contagiarse.

Señales y síntomas



Secreción nasal



Tos



Vómitos o arcadas después de toser



Agotamiento

Los primeros síntomas de la tosferina son similares a los del resfriado común e incluyen goteo nasal, fiebre baja o ausencia de fiebre y una tos leve. Después de una o dos semanas de la enfermedad, la tos cambia y tiende a ser súbita e incontrolable y un acceso de tos sigue a otro sin pausa ni aliento. Puede presentarse un sonido agudo y sibilante fuerte al inhalar después del acceso de tos.

La tosferina puede tratarse con antibióticos y el tratamiento es mucho más efectivo cuando se inicia al principio de la enfermedad. La tos puede continuar durante muchas semanas después del tratamiento, especialmente cuando se empieza a tratar tardíamente.

Prevención



Lávese las manos con frecuencia



Cúbrase la boca con la manga al toser



Quédese en casa si está enfermo



Vacúnese (DTaP para niños y Tdap para adultos)

Para más información, visite:



1. www.maine.gov/dhhs/pertussis
2. www.cdc.gov/pertussis

También puede llamar al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Maine, al 1-800-821-5821.